

IMPULSE 800 SC

Section 1 : Informations générales

Nom du fabriquant : BAYER.

N° Homologation : 977/16/FO /HOMO/CNHPCAT/CMR

Conditionnement : Futs en PEHD de 200 litres

Section 2 : Composition chimique

Concentration : Spiroxamine 800g/l

Famille chimique : spirocétalamines

Type de formulation : Suspension concentré (SC)

Classe toxicologique : II MODEREMENT TOXIQUE

Section 3 : Informations techniques

Mode d'action : Impulse est un fongicide systémique avec une activité protectrice et curative. Impulse a une absorption très rapide dans les tissus végétaux et une excellente résistance à la pluie. Il a une distribution rapide et uniforme dans les feuilles sans accumulation dans les pointes des feuilles.

Section 4 : Usage et dose d'application

Cultures	Bananes
Cible	Cercosporiose jaune et noire du bananier (<i>Mycosphaerella musicola</i> et <i>Mycosphaerella fijensis</i>)
Dose d'application	0,4 L p.c /ha
Spécification d'usage	Traitement à l'huile 0.4L p.c impulse + 5-8 l/ha huile Traitement en émulsion 0.4L p.c impulse + 5-8 l/ha huile + émulsifiant (0,5 – 1% du volume d'huile) + eau pour atteindre un volume total de 13-15 l/ha.
Délais avant récolte	0 jour

Section 5 : Recommandations

- Mode d'application : Par pulvérisation pas plus de 02 applications par saisons. Intervalle d'applications : 28 jours.

Section 6 : Précautions d'emploi

- Porter les vêtements de protection appropriés et des gants
- Tenir hors de la portée des enfants, à l'écart des aliments, des boissons et des animaux
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire pendant 15 minutes puis consulter un médecin
- En cas d'ingestion, prévenir immédiatement le centre antipoison ou le centre de santé le plus proche
- Ne pas manger, boire, pendant la manipulation et le traitement.

Emballages vides : SODEAC récupère les emballages des produits qu'elle commercialise. Vous pouvez les ramener au point de vente le plus proche ou les remettre aux agents SODEAC de passage.



ATTENTION

